

Sherman

Sherman est une variété mi-précoce avec un bon goût et un pourcentage élevé de gros tubercules. Elle peut être utilisée comme "pomme au four".



 **Madeleine**

 **Saphire**

Caractères de base

Dormance	7
Levée	7
Maturité	6,5
Forme des tubercules	RO
Régularité de forme	7
Calibre des tubercules	8,5
Régularité du calibre	7
Nombre du tubercules	6
Profondeur des yeux	6,5
Couleur de la peau	JCJ
Couleur de la chair	JCJ
Rendement précoce	125
Rendement à maturité	110

Résistance à /Tolérance à

Nématode Rostochiensis	1, 4, 2-3
Nématode Pallida	-
Galle verruqueuse	1
Mildiou du feuillage	5
Mildiou du tubercule	8
Virus Y	8
Gale commune	7
Gale Poudreuse	6,5
Fusariose spp	7
TRV (Tache de la rou)	7
Dommages d'arrachage	7
Repousse	6,5
Tacheture bluese	6

Mise en culture et conservation

Traitement du plant	Moyenne
Choix parcellaire	Très polyvalente en terme de terroirs d'implantation
Fertilisation	N ± P + K ± Mg +
Plantation	Une densité de plantation plus dense
Culture	Pour une belle forme, la structure du sol est très importante.
Sencoral	Non-sensible au Sencoral
Récolte	A récolter avec précaution
Conservation	Ne ventilez pas inutilement
Transformation	A manipuler avec précaution à cause du calibre
Point d'attention	Une croissance régulière est très importante



potato driven

Qualité

Présentation de la peau	6,5
Poids sous l'eau	340
Matière sèche %	18,7
Type de cuisine	B
Qualité de consommation	7
Chips	-
Pommes frites	-

Explications

Général 9 (=favorable) 1 (=défavorable)
 Forme des tubercules: R (=ronde) O (=ovale) L (=longue)
 Couleur: JF (=jaune foncé) J (=jaune) JC (=jaune claire) C (=crème) B (=blanche) R (=rouge) V (=violet) Br (=brun)

Segment



Input



Ce document constituant un ensemble de directives, la décision finale incombe donc à l'utilisateur, le producteur. Plantera ne pourra par conséquent être tenu pour responsable des dommages qui pourraient advenir.